

# Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie

## Dřeviny v zimním stavu III.

<p>větvičky tenké, lesklé, světlé, s výraznými pupeny mězernými, sčítané o kůře</p> <p><b>Taxodium distichum</b> (L.) L. C. Richard – tisovec dvouřadý (Cupressaceae/Taxodiaceae)</p>	<p>letosty říhované s povětšinou výraznými listovými postříškami o rozvolněné nepravidlé zrcátkové pupeny, se špičkami na ústředním okrajovém pupenu malém, kulovité až kuželovité</p> <p><b>Larix decidua</b> Mill. – modřín opadavý (Pinaceae)</p>	<p>letosty silné, šedohnědé, starší větve zřetelně bíle chlupaté</p> <p><b>Ginkgo biloba</b> L. – jinan dvouřadý (Ginkgoaceae)</p>	<p>letosty šedohnědé, příslušně chlupaté, starší větve zřetelně bíle chlupaté</p> <p><b>Laburnum anagyroides</b> Medic. – štědřenec převislý (Fabaceae)</p>	<p>letosty imozelené, o mládí řídké chlupaté, zřetelně s výraznými listovými postříškami, bez trnů</p> <p><b>Sophora japonica</b> L. – jeřáb japonský (Fabaceae)</p>	<p>letosty šedé, mělké rýhované</p> <p><b>Amorpha fruticosa</b> L. – neteřev květovitá (Fabaceae)</p>	<p>letosty chlupaté, sedlákové až žlutohnědé s lenticulami, starší větvičky šedé, jemně rozpraskané</p> <p><b>Morus alba</b> L. – morušovník bílý (Moraceae)</p>
<p>letosty žlutohnědé, lesklé, lysé, světlé listovité</p> <p><b>Ribes alpinum</b> L. – rybíz alpský, meruzalka alpská (Grossulariaceae)</p>	<p>letosty šedohnědé, hustě šedě chlupaté a s odlišnými černošedými žlábkovými chlupy</p> <p><b>Corylus avellana</b> L. – líška obecná (Corylaceae)</p>	<p>letosty žlutavé, o mládí řídké chlupaté, brzo odlišující, větvičky od 2. roku s rozvolněnou korkovou světlešedou kůrou, u větve</p> <p><b>Corylus colurna</b> L. – líška turecká (Corylaceae)</p>	<p>letosty lesklé, světlé až žlutavé, brzo odlišující, větvičky od 2. roku s rozvolněnou korkovou světlešedou kůrou, u větve</p> <p><b>Sorbus torminalis</b> (L.) Crantz – jeřáb břeč (Malaceae/Rosaceae)</p>	<p>letosty zelené až hnědé, lysé, starší větvičky stříbrné, s tenkými chlupy</p> <p><b>Amygdalus nana</b> L. – mandloň nízká (Amygdalaceae/Rosaceae)</p>	<p>letosty tenké, žlutohnědé až hnědé s rezavými lenticulami, lysé až hustě plávnaté chlupaté, po rozemnutí ova kumární</p> <p><b>Padellus mahaleb</b> (L.) Vessilz. – mahalebka obecná, třesák mahalebka (Amygdalaceae/Rosaceae)</p>	<p>letosty tenké, lesklé, jemně chlupaté, povětšinou výrazně žlutohnědé s výraznými lenticulami, drahob. u větve</p> <p><b>Prunus avium</b> Miller – střešcha obecná, hrozovitá (Amygdalaceae/Rosaceae)</p>
<p>letosty přímé, silné, lysé, šedě až světlé, s výraznými lenticulami, starší větve zřetelně bíle chlupaté</p> <p><b>Cerasus avium</b> (L.) Moench. – třešňák ptáčí (Amygdalaceae/Rosaceae)</p>	<p>letosty přímé, lysé, tmavě olivově šedohnědé, s drobnými lenticulami s pětúhelníkovou dření</p> <p><b>Quercus robur</b> L. – dub letní (Fagaceae)</p>	<p>letosty přímé, lysé, tmavě olivově šedohnědé, s drobnými lenticulami, s pětúhelníkovou dření</p> <p><b>Quercus petraea</b> (Mattuschka) Lieblein – dub zimní (Fagaceae)</p>	<p>letosty tenké, světlé, s výraznými lenticulami, lesklé, lysé</p> <p><b>Quercus rubra</b> L. – dub červený (Fagaceae)</p>	<p>letosty přímé, tenké, šedé až hnědé plávnaté, s pětúhelníkovou dření</p> <p><b>Quercus pubescens</b> Willd. – dub pyřitý, šípák (Fagaceae)</p>	<p>letosty silné, světlé, s výraznými lenticulami, s pětúhelníkovou dření</p> <p><b>Quercus cerris</b> L. – dub cer, slovenský (Fagaceae)</p>	<p>letosty šedohnědé, šedobílé až tmavě žlutohnědé, u větve bílé chlupaté, jemně lysé</p> <p><b>Malus domestica</b> Borkh. – jablono domácí (Malaceae/Rosaceae)</p>
<p>letosty lysé, světlé, s výraznými lenticulami, starší větve zřetelně bíle chlupaté, s výraznými lenticulami</p> <p><b>Pyrus communis</b> L. – hrůše obecná (Malaceae/Rosaceae)</p>	<p>letosty říhované, lysé nebo jen řídké chlupaté, se špičkami, starší větvičky měkce a korkovými listami</p> <p><b>Ulmus minor</b> Miller – jilm polní, ladní (Ulmaceae)</p>	<p>letosty říhované, tmavě šedohnědé, silné, zřetelně rezavě chlupaté, až třetím rokem lysé</p> <p><b>Ulmus glabra</b> Huds. – jilm horský (Ulmaceae)</p>	<p>letosty říhované, světlé, hnědé až černošedé, měkce chlupaté, starší větve zřetelně bíle chlupaté, s výraznými lenticulami</p> <p><b>Ulmus laevis</b> Pallas – jilm vaz (Ulmaceae)</p>	<p>letosty tenké, srovnávané, černošedé s bílými lenticulami, starší větve zřetelně bíle chlupaté</p> <p><b>Fagus sylvatica</b> L. – buk lesní (Fagaceae)</p>	<p>letosty tenké, srovnávané, černošedé s bílými lenticulami, starší větve zřetelně bíle chlupaté</p> <p><b>Carpinus betulus</b> L. – habr obecný (Corylaceae)</p>	<p>letosty tenké, ohebné, lysé, hnědové, bíle broušávané (přyskyňované žlázkami), dření pětúhelníkovou až čtverhrannou, na starších větvích brachyblasty</p> <p><b>Betula pendula</b> Roth. – břıza bělokorá, bradavičnatá (Betulaceae)</p>
<p>letosty chlupaté, černošedé, bez žláček, dření pětúhelníkovou až čtverhrannou, na starších větvích brachyblasty</p> <p><b>Betula pubescens</b> Ehrh. – břıza pyřitá (Betulaceae)</p>	<p>letosty oblé, lysé, světlé až žlutavé, dření pětúhelníkovou, listové postříškou výrazně</p> <p><b>Populus nigra</b> L. – topol černý (Salicaceae)</p>	<p>letosty oblé, lysé, lesklé, světlé až žlutavé, dření pětúhelníkovou, listové postříškou výrazně</p> <p><b>Populus tremula</b> L. – topol osika, osika obecná (Salicaceae)</p>	<p>letosty oblé, lesklé, světlé až žlutavé, dření pětúhelníkovou, listové postříškou výrazně</p> <p><b>Populus alba</b> L. – topol bílý, linda (Salicaceae)</p>	<p>letosty tmavohnědé, nekdy popelavé, jen o mládí světlé chlupaté, dření pětúhelníkovou, listové postříškou výrazně</p> <p><b>Sorbus aucuparia</b> L. – jeřáb ptáčí (Malaceae/Rosaceae)</p>	<p>letosty lesklé, hnědé, o mládí řídké plávnaté, povětšinou výrazně žlutohnědé s výraznými lenticulami, omláď šedě, šedohnědé</p> <p><b>Sorbus aria</b> (L.) Crantz – jeřáb muk, muk obecný (Malaceae/Rosaceae)</p>	<p>letosty oblouhé, světlé s pětúhelníkovými lenticulami, o mládí šedavě plávnaté, výrazně žlutavé až olivové, kuželovité až vejčité, zřetelně špičaté, pupeny špičaté</p> <p><b>Sorbus domestica</b> L. – jeřáb oskeruše, oskeruše domácí (Malaceae/Rosaceae)</p>

Legenda: ■ jehličnany, střídavé pupeny ve spirále ■ listnáče, střídavé pupeny, bez trnů

Zpracováno podle: Szymanowski, T. Rozpoznávání dřev a krzewów ozdobnych w stanie bezlistnym, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa, 1974 (obrázky), Červenka, M., Čigánová, K.: Klíč k určování dřevin podle pupenů a větviček, SPN, Praha, 1989 (obrázky), Kolibáčová, S., Čermák, P., Úradnický, L.: Dendrologie I (cvičení), MZLU, Brno, 2002 (texty)

